



Canadian Association of Perinatal and Women's Health Nurses
Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes

Chers membres de CAPWHN :

Vous trouverez ci-joint l'énoncé de position de CAPWHN sur la formation en surveillance du bien-être fœtal, approuvé à la réunion du conseil d'administration du 21 février 2018. Notre objectif en développant cette déclaration était de souligner aux infirmières et à leurs employeurs l'importance de la formation continue des infirmières responsables de l'interprétation et des réponses initiales à l'auscultation intermittente, au monitoring fœtal électronique et à l'activité utérine pendant la grossesse et le travail.

Le conseil d'administration de CAPWHN est préoccupé par la qualité de la surveillance du bien-être fœtale au Canada et à l'étranger.

Bien que de nombreux décès périnataux soient pas évitables (anomalies congénitales, prématurité extrême, événement inattendu), une proportion importante des décès périnataux hypoxiques intrapartum peut être évitable. Les facteurs influents comprennent le déficit de connaissances, l'application des connaissances aux soins, la connaissance de la situation, la communication et l'accès à des services / ressources opportuns ou une combinaison de ces préoccupations.¹

Canada: Dans le rapport 2016, Les services obstétrique au Canada-Faire progresser la qualité et renforcer la sécurité trois facteurs de risque principaux ont été identifiés en étant contribuant à 58% des coûts des litiges. Ceux-ci comprenaient l'incapacité à interpréter / répondre à un statut fœtal anormal (42%), à surveiller l'état fœtal (10%) et à communiquer l'état fœtal (6%).

Royaume-Uni: Le rapport de 2015 *Each Baby Counts*, démontre que 1136 décès et blessures graves peuvent être attribués à des facteurs étiologiques. Des 727 audits réussis, 56% ont démontré une lacune soit dans la capacité d'interpréter ou dans la connaissance de la prise en charge des tracés des fréquences cardiaque fœtale.

Australie et Nouvelle-Zélande 2016: 53% des décès causé par « l'hypoxie » (PSANZ) ont été jugés potentiellement évitables (13% de tous les décès périnataux).

La formation et les mises à jour régulières de l'éducation sont essentielles pour améliorer la situation. La Nouvelle-Zélande a déclaré en 2014 que « la formation interdisciplinaire devrait être obligatoire pour tous les cliniciens impliqués dans les soins intrapartum qui participent à la surveillance fœtale ». En Australie, le taux de mortalité hypoxique intrapartum à terme est passé de 2,02 à 1,07 pour 10 000 naissances après l'introduction d'un programme interdisciplinaire de formation de la surveillance fœtale.

Le conseil d'administration de CAPWHN vous invite à prendre le temps de partager cette information et à réfléchir à la façon dont vous pouvez faciliter la participation des infirmières en périnatalité aux programmes éducatifs et aux exercices d'urgences d'équipes interdisciplinaires.

Bien à vous,

Présidente de CAPWHN

¹ Dr Mike Bow, président de la SOGC, a présenté ces résultats à la réunion de FMC de l'Ontario suite de la déclaration du conseil d'administration de la SOGC recommandant que les médecins aient des mises à jour et des rafraîchissements réguliers.